

ABRASIÓN CUTÁNEA EN PIE, CON FATAL DESENLACE. IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ.

Javier Sami Hamam Alcober (1), Alicia Báguena García (2), Mercedes Campoamor González (3), Carmen Martínez Aznar (3), Adrian Martín Martínez (3), Alberto Hernández Fernández (3)

- (1) Adjunto Traumatología Hospital Universitario Miguel Servet Zaragoza
(2) Adjunta Urgencias Hospital Royo Villanova Zaragoza
(3) Residente Traumatología Hospital Universitario Miguel Servet

INTRODUCCIÓN

El melanoma de localización en pie, es una entidad poco frecuente, que en su fase inicial, puede simular otras patologías banales.

OBJETIVOS

Recordar la importancia del diagnóstico precoz en el tratamiento y pronóstico del melanoma en el pie, entidad que puede acabar siendo diagnosticada en la consulta del traumatólogo.

MATERIAL Y METODOLOGÍA

Exposición de un caso clínico y revisión bibliográfica sobre el melanoma localizado en pie.

RESULTADOS

Paciente varón de 47 años, que presenta lesión cutánea por el roce del calzado.

Tras el paso por las consultas de Dermatología y Cirugía General, se recibe al paciente diagnosticado de granuloma en pie. Se indica exéresis-biopsia preferente, realizando resección en bloque. El informe de Anatomía Patológica alerta de que se trata de un melanoma nodular en fase de crecimiento vertical. Han pasado casi 10 meses desde la consulta inicial.

Tras Punción-Aspiración con Aguja Fina de adenopatía inguinal positiva para células malignas, es sometido a intervención quirúrgica, realizando ampliación de resección previa, con cobertura con colgajo sural, y vaciamiento ganglionar inguinal, con afectación masiva en uno de los seis ganglios extirpados.

Se practica resección laparoscópica de suprarrenal izquierda, siendo su estudio histológico, positivo para metástasis de melanoma.

A los cien días de la realización del primer estudio de extensión, aparecen metástasis pulmonares, hepáticas, carcinomatosis peritoneal e implantes en pared abdominal.

Diez días más tarde, el paciente ingresa de urgencia con gran deterioro de su estado general, precisando paracentesis evacuadora. La evolución resulta ser fatal, con exitus por fracaso multiorgánico en las siguientes 48 horas, habiendo transcurrido menos de cinco meses desde el diagnóstico histológico.

CONCLUSIONES

El melanoma de aparición en el pie, es una patología poco frecuente y de difícil diagnóstico precoz. La localización específica en el talón, es aún menos habitual, siendo la más frecuente en la planta.

El error diagnóstico inicial, es recogido en publicaciones similares, y el tiempo medio en su diagnóstico es de 16 meses. El espesor de la lesión en el momento del diagnóstico, está en relación con la aparición de extensión linfática, y ambas con el pronóstico.

Ante la presencia de una lesión atípica, de rápido crecimiento, friable, o recurrente, no se debe olvidar la posibilidad de patología maligna y acelerar, en la medida de lo posible, la realización de biopsia diagnóstica para mejorar la supervivencia.

