

TRATAMIENTO DEL MÜLLER-WEIS MEDIANTE OSTEOTOMÍA VALGUIZANTE DE CALCANEEO

La enfermedad de **Müller-Weis** es una displasia del escafoides tarsiano ya presente en la infancia.
 Manifestación clínica: 40-50 años
 Asociada astrágalo varo y déficit nutricional durante el proceso de osificación

Presentamos caso clínico de paciente diagnosticado de enfermedad de Müller-Weis tratada mediante osteotomía valguzantes de calcaneo.

Mujer 55 años.
 Presenta dolor subastragalino y astrágalo escafoideo de años de evolución

A la exploración:

- Retropie varo.
- Rango de movilidad completo
- Antepie correcto.



Se programa al paciente para intervención quirúrgica:

- Osteotomía valguzante tipo Koutsogiannis
- Fijación con 2 tornillos canulados 4,5 mm diámetro.



Inmovilización con bota tipo Walker 8 semanas
 Deambulación con carga a la 4ª semana
 Movilidad completa a los 3 meses
 Reincorporación laboral 6 meses

La enfermedad de Müller-Weis es una enfermedad infrecuente que se caracteriza por la deformidad del escafoides tarsiano y retropie en varo.
 Su tratamiento actual de elección consiste en osteotomía valguzante de calcaneo, obteniendose buenos resultados y recuperación labora y deportiva precoz.

MELODIA MOLINERO MONTES
 CARLOS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
 BORJA FERNÁNDEZ BLANCO
 JAVIER GOSALBEZ GARCIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS
 HOSPITAL DE SIERRALLANA